

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP30-7-68820656

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

Abonnement Annuel

(Tél. 92.28.72).

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

N° 94 - Juillet 1968 / 26
4ème supplément

MOUCHE DE L'OLIVE

Notre poste de piégeage de Mailhac (Aude) a enregistré les premières captures le 18 Juillet; leur nombre croît régulièrement. La climatologie actuelle fait présumer le début des piqûres à partir des premiers jours d'Août. Il est donc nécessaire d'assurer immédiatement la protection des cultures des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault (à l'ouest du fleuve); dans le Gard et l'Hérault (entre le fleuve et le Vidourle) les traitements pourront être retardés d'une semaine, l'insecte ayant été contrarié par les vents froids que nous avons connus.

MOUCHE DES FRUITS

Les captures sont extrêmement rares. La protection sera assurée par les traitements judicieux choisis pour combattre d'autres ravageurs.

TORDEUSE ORIENTALE

A Montpellier nous continuerons d'observer des larves d'âge divers. Commencer les traitements de protection des fruits arrivant à maturité durant la 1ère décade de Septembre.

TROUILLON

Poirier

Psylle

Les attaques de Psylle se poursuivent et provoquent des attaques importantes de fumagine qui salissent les fruits.

Continuer le traitement contre ces insectes.

Poirier - Pommier

Carpocapse

Le vol continue.

Poursuivre la lutte en tenant compte dans le choix des insecticides, de la limite d'utilisation des produits en fonction de la cueillette.

Zeuzère

Le vol de zeuzère se poursuit surtout dans les vergers des zones littorales.

Dans les vergers de régions envahies par ce parasite, un traitement est nécessaire.

Pommier

Sésie

Un vol très important est observé depuis huit jours à Marsillargues (Hérault) et dans la région.

Un traitement soigné est indispensable dans les vergers en vallées avant le 5 Août.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

P. BERVILIE

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

Rouille de l'asperge

Cette maladie évolue cette année par foyers. Contrairement aux années normales, on la rencontre plus fréquemment dans les cultures en situation sèche que dans la zone littorale sablonneuse soumise aux rosées matinales.

Dans toutes les plantations, quelle que soit la contamination, continuer les traitements déjà préconisés en s'appliquant tout particulièrement à obtenir une bonne pénétration des bouillies au centre des touffes.

Nous rappelons les produits qui peuvent être utilisés contre la Rouille : Manèbe, Mancozèbe, Ferbam, Thiocyanodinitrobenzène, etc...

Acarieus sur fraisiers

Des attaques d'acarieus sont observés un peu partout aussi bien dans les cultures anciennes que sur les jeunes plants de frigo qui viennent d'être plantés.

Des traitements s'imposent donc. Nous rappelons que l'alternance des acaricides évite le phénomène d'accoutumance et que le choix des produits doit être fait en fonction des acarieus présents (araignées rouges ou jaunes).

CHRESTIAN - LAVY

Tirage du 29 Juillet 1968